



PHARMAZEUTISCHE FABRIK
DR. RECKEWEG & CO.
BENSHEIM



FICHA TÉCNICA

DR. RECKEWEG JUTUSSIN R8 SOLUCIÓN ORAL

Medicamento Homeopático

Composición: Cada 100 g de jarabe contiene Ammonium causticum D2 1,00 g, Belladonna D2 1,00 g, Bryonia D2 1,00 g, Chamomilla D2 3,00 g, Coccus cacti D5 1,00 g, Corallium rubrum D10 1,00 g, Cuprum aceticum D10 1,00 g, Drosera D2 1,00 g, Ipecacuanha D3 1,00 g, Thymus vulgaris D2 3,00 g, Saccharum 40,00 g, Saccharum tostum 0,26 g, Ethanolum / Aqua purificata c.s.p. 100,00 g. 13% vol. alcohol.

Indicación: Coadyuvante en el tratamiento de la bronquitis y tos convulsiva en adultos.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- **Ammonium causticum:** fuerte irritación de la laringe, sensación de ardor e hipersensibilidad de la mucosa, ronquera, tos grave e incesante acompañada de dificultad para respirar.
- **Belladonna:** tos espasmódica, tos profunda, mucosa seca.
- **Bryonia:** tos seca irritante con dolor en el pecho.
- **Chamomilla:** irritación de la laringe, hipersensibilidad de la tráquea, tos incesante o frecuente, ronquera, empeoramiento de los síntomas durante la noche y mejora a través de la transpiración.
- **Coccus cacti:** ataques de tos con vómitos, mucosas viscosas.
- **Corallium rubrum:** tos espasmódica fuerte acompañada de asfixia.
- **Cuprum aceticum:** ataques de tos graves con sofocamiento y sensación de presión en el pecho, espasmos broncomusculares con colapsos y cianosis.
- **Drosera:** tos permanente, especialmente durante la noche, con garganta seca y punzadas en el pecho. Espujo hemoptoico, náuseas al toser.
- **Ipecacuanha:** tos seca asfixiante con malestares y vómitos.
- **Thymus vulgaris:** expectorante.

Forma Farmacéutica: Solución oral

Vía de administración: Oral

Posología: Tomar una cucharadita cada 2 horas hasta un máximo de 6 al día, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría tomar 1 cucharadita 3 veces al día.

Bebés de 0 a 12 meses y niños de 2 a 5 años: tomar 1/4 cucharadita mezclada con 3 cucharaditas de leche, hasta un máximo de 4 al día.

Niños de 6 a 12 años: tomar 1/2 cucharadita hasta un máximo de 6 al día. Si se aprecia mejoría hasta un máximo de 3 veces al día.

Nota para diabéticos: una cucharadita de café = 5ml = 0,17 BU (Bread Units).

Presentación: Caja con 1 frasco de 150 mL + folleto informativo al paciente.

Almacenamiento: Conservar en un lugar fresco y seco a no más de 30 ° C.

Especificaciones técnicas:

- **Aspecto:** solución amarillenta a parda.
- **% etanol:** 12%- 15%
- **Densidad relativa:** 1.131 – 1.166 g/mL



Condición de venta: Directa

Registro ISP N °: H-1295/22

Fabricado en Alemania por: Pharmazeutische Fabrick Dr. Reckeweg & Co. GmbH- Bensheim.

Importado y Distribuido en Chile por: Escollanos Medicamentos Biológicos y compañía Ltda.